

目 次

第36回日本血液事業学会総会会告(2)	563
原著 血管穿刺時の神経損傷・神経障害の新概念による病態解明とその予防 その2	
献血者における上肢のSubclinicalな状態の出現頻度	嶋 裕子ほか 573
IgA・ハプトグロビン欠損ドナープール構築のための欠損確認検査	下山田高茂ほか 579
報告 血管穿刺時の神経損傷・神経障害の新概念による病態解明とその予防 その1	
過去約2年間に神経損傷・神経障害の疑いで病院を受診した当センター	
10症例の検討	嶋 裕子ほか 591
HCV-RNAの検出からHCV抗体が検出されるまでに	
52週を要した1症例	日野 郁生ほか 595
京都府における1単位赤血球製剤の受注と供給状況	
～1単位製剤の必要本数と安定供給への課題～	樋口 征昭ほか 599
献血啓発としての学校出前講座の実践とその意義	松坂 俊光ほか 605
配置換え看護師のための研修システムの問題点と改善の試み	喜多 陽子ほか 613
第35回日本血液事業学会総会	
特別講演1	621
特別講演2	625
教育講演2	629
教育講演3	635
教育講演4	639
教育講演6	643
総会長シンポジウム	647
血液事業 Blood Programme 第34巻総目次	657

CONTENTS

Peripheral nerve problems following veni-puncture

—SFPD (The sum of factors concerning peripheral disorders) hypothesis and its prevention—Part 2

Prevalence of subclinical disorders in normal blood donor Hiroko Shima *et al.*..... 573

Identification and characterization of IgA deficiency and haptoglobin (Hp) deficiency

among Japanese blood donors for the establishment of a registration system of plasma

protein-deficient donors Takashige Shimoyamada *et al.*..... 579

Peripheral nerve problems following veni-puncture

—SFPD (The sum of factors concerning peripheral disorders) hypothesis and its prevention—Part 1

A case report of 10 cases that complained neurological symptoms and

required treatment in hospitals after blood donation Hiroko Shima *et al.*..... 591

A case of hepatitis C virus infection that an antibody detection required 52 weeks

from the infection Ikuo Hino *et al.*..... 595

Demand and supply situation of 1 unit red cell concentrates in Kyoto

—required number of 1 unit red cell concentrates and subject to

a stable supply Masaaki Higuchi *et al.*..... 599

The significance of the delivery school lectures for the enlightenment of

blood donation Toshimitsu Matsusaka *et al.*..... 605

The problems and their improvement of the training system for the nurses

transferred between departments Yoko Kita *et al.*..... 613